

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 27-4-64 290685

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

EDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,  
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 11, rue de la Pieau - TOULOUSE.  
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Supplément n° 2 au bulletin n° 43

1964-9

## - AVERTISSEMENTS -

### ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - L'apparition récente des premières taches dont les germes vont s'ajouter aux ascospores qui sont toujours projetées en abondance d'une part, la persistance d'un temps très pluvieux d'autre part, imposent un renouvellement urgent de la précédente application.

### VIGNE

BLACK-ROT - Les organes hivernant (périthèces) sont mûrs depuis quelque temps et les pluies provoquent déjà des projections d'ascospores.

Bien que le débourrement soit encore peu avancé, notamment dans les vignobles faisant habituellement l'objet d'attaques de Black-rot (Htes-Pyrénées, Gers, Lot, Tarn) des contaminations sont possibles dès à présent, surtout dans les vignes fortement infestées l'année dernière.

Uniquement dans ces vignes, un traitement pourrait être mis en place dès que les cépages sensibles présenteront des feuilles étalées.

## - INFORMATIONS -

### ARBRES FRUITIERS

ARAIGNÉES ROUGES (sauf P. Ulmi) - PSYLLE DU POIRIER - PUCERONS DIVERS -

En raison des fortes chutes de pluie de ces derniers jours, il serait utile de répéter le traitement.

MONILIA -GNOMONIA DU CERISIER - Dès réception appliquer un traitement fongicide avec un produit fongicide de synthèse.

### VIGNE

MILDIOU - Nous rappelons les termes du précédent bulletin. Eviter la formation de flaques en favorisant l'écoulement des eaux de pluie. Supprimer les repousses inutiles situées à la base des souches. C'est en effet le plus souvent au niveau de ces pousses, très près du sol, que se forment les foyers primaires à partir desquels la maladie peut envahir ensuite rapidement l'ensemble du vignoble.

OIDIUM - Lorsque les jeunes pousses atteignent quelques centimètres de longueur (5cm environ) appliquer, par une belle journée, un soufre, par poudrage de préférence.

2.7.65

FRAISIER

POURRITURE GRISE ET MALADIE DES TACHES ROUGES - Les pluies persistantes actuelles risquent de permettre un développement important de ces deux maladies. En conséquence il serait utile d'effectuer une nouvelle application avec un produit à base de Captane ou de T.H.T.D.

COLZA

CHARANCON DES SILIQUES - De nombreux champs de colza sont envahis par le charançon des siliques, de plus en plus abondant, notamment sur les bordures -avec les journées chaudes la pullulation peut s'aggraver-.

Dès qu'on observe plusieurs charançons par hampe florale, il est recommandé de traiter. Le traitement sera effectué, dans toute la mesure du possible, au cours d'une journée ensoleillée.

Comme il intervient pendant la floraison, seuls les produits non toxiques à l'égard des abeilles peuvent être utilisés.

PROTECTION DES ABEILLES - Se reporter aux indications contenues dans notre bulletin du 25 Mars 1964.

TOULOUSE, le 21 AVRIL 1964

les Contrôleurs chargés  
des Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

l'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux,

L. IMBERT